


דף מידע - פירות קיץ

על פי ספרי הרוב משהquia "בדיקות המזון כהלכה"
מעודכן לקייז תשע"ט



פירות קיץ נגועים לעיתים בתולעים, ויש לבדוק
היטב לפני האכילה.
בפירות מגניות פרטיות אחויז הنجיעות
גבוהים יותר.

• אבטיח

בחזקת נקי ואינו טעון בדיקה.

• אפרסק ונטרינה

1. **כニימות – על קליפת הפירות מצויות לנימיות רוחקות לנימיות אפורות על גבי כתמים אדומים.** במידה ישנן לנימיות מסוימות אותן ע"י גירוד כל בצליפורן או בסכין. הכתם האדום אינו אסור באכילה.
2. **נגינות פנימית – מהתבוננים היטב על קליפת הפירות.** אם מבחנים בכתם כהה, נקודה כהה או נקב קטן, מסוימים את הקליפה ובודקים אם יש סימן של חידור תולעת קתנה במקום זה. לאחר מכן חתך לרוחב הפירות בצדיו העליון סמור לעוקץ ומתבוננים אם חדרה ממש תולעת. אזורים רכים או כהים בפרי יש לחותר, לקפל החוצה ולהתבונן היטב אם מצויה תולעת קתנה בתוך בשור הפירות. (תולעים נטיה להחמק אל תוך הפירות ולעהלם כאשר הן נשפות). טוב לאכול אפרסק "עם סכין ביד" דהיינו לחותר חתיכה, להתבונן בה לפני אכילתתה וכן הלאה.

• בננות

על קליפות הבננות מצוים לעיתים חרקים במצבם במצבם לפירות בעת הקילוף. מונרים את האשכול על גבי משטח לבן ובמידה ונמצאו על המשטח חרקים קטנים (הרצים במהירות) מן הרואוי לשטוף כל בננה לפני הקילוף.

• דובדבן

חויצים את הפירות, מוציאים את הגלעון, הופכים את חצאי הפירות החוצה ומ התבוננים אם מצויה תולעת לבנה קתנה בתוך בשור הפירות.

• מלון

באופן רגיל נקי. אם מבחנים באוזור רך במיוחד (בפרט באוזור השקע של הגבעול), יש לבדוק באוזור זה אם מצויות תולעים לבנות בתוך בשור הפירות.

• משמש

- חויצים את הפירות, מוציאים את הגלעון ומ התבוננים אם מצויה חולצה חום-אדום. אם הפירות רך מקפלים החוצה כל אחד מחצאי הפירות ובודקים אם מצויה תולעים לבנות בתוך בשור הפירות (עדיף לחותר כל חצי לכען שלושה פלחים). נקודות אדומות או חומות על קליפת המשמש איןנן כニימות.

• ענבים

1. מסירים את הענבים הפוגמים. אשכולות גדולים וצפויפים מפרידים לכמה חלקים.
2. מסרים את אשכולות הענבים במים עם מעתן נזול לנקיי כגון "סבון כלים" למשך שלוש דקות.
3. שוטפים היטב כל אשכול הכל הצדדים ובין גרגרי הענבים תחת מים זורמים.
4. ענבים יוקים – בעת האכילה מ התבוננים בכל ענב ונקב או כתם כהה החודר פנימה, חוות את הענב במקום החשור ומ התבוננים אם מצויה תולעת בתוכו.
5. ענבים שחורים או ענבים מגידול ערבי – חוות מדגם של כ-10% מהפירות ובודקים אם מצויה בהם נגינות פנימית. אם נמצא נגיעה יש לפתח את כל הענבים.
6. ענבים להכנת יין – אין צורך לבדוקם. לאחר עשיית היין יש לטנוו דרכ מסננת צפופה כגון נפת קמפה.

• שזיף

1. **כニימות –** לעיתים רוחקות לנימיות אפורות על קליפת הפירות, מסוימים אותן בשפשוף בצליפורן או בסכין.
2. **נגינות פנימית:**

 - **שזיף עגול –** חותכים חתך לרוחב הפירות בצדיו העליון סמור לעוקץ ומתבוננים אם יש סימן לחידור תולעת. מהתבוננים בצדיו החיצוני של הפירות אם מצוי נקב, אוזור רך או כתם חשור. חוות את האוזור החשור ובודקים אם מצויה תולעת בשור הפירות.
 - **שזיף ארוך (שגב) –** חוות לאורך החירץ, מוציאים את הגלעון ומ התבוננים אם מצויה נגינות פנימית.

• תות עץ ופטל

מצויה בו נגינות גבואה וקשה מאד לבדוקו או לנוקתו.

• תפוח עץ

ראוי להחות תפוח קיץ לפני האכילה. תפוח מזון "ענה" – אם יש נקודה אפורה שקוועה בקליפת התפוח מקלפים את הפירות במקום זה ומ התבוננים אם חדרה תולעת. על קליפת תפוח מזון ענה ותפוחים הגדלים בגין פירות מציגות לנימיות כניימות אפורות ומסביבן כתם אדום. ניתן להסiron בקלות ע"י שפשוף בצליפורן או בסכין והכתמים האדומים אינם אסורים באכילה.